

2014年执业药师——《中药学综合知识与技能》

一、最佳选择题（共40题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最佳答案。）

1、下列属于症的是（A）

- A、嗝气
- B、食积
- C、热淋
- D、虚劳
- E、鼻渊

2、下列药物属阳的是（A）

- A、补中益气
- B、清热导滞
- C、降气收敛
- D、消积导滞
- E、降逆收敛

3、下列是按相生规律制定的是（B）

- A、佐金平木
- B、益火补土
- C、培土制水
- D、泻南补北
- E、抑木扶土

4、下列称为娇脏的是（E）

- A、肾
- B、肝
- C、脾
- D、心
- E、肺

5、“水火既济”是指（B）

- A、心与肝的关系
- B、心与肾的关系
- C、心与脾的关系
- D、心与肺的关系
- E、脾与肾的关系

6、偏阳体质者易于表现为（B）

- A、疲劳
- B、急躁
- C、喜热
- D、喜静

E、少动

7、具有生风动血致病特点的外感病邪是(E)

- A、风邪
- B、寒邪
- C、暑邪
- D、燥邪
- E、火邪

8、舌胖大，有齿痕，所属的是(B)

- A、肺气虚
- B、脾气虚
- C、肾阴虚
- D、肝血虚
- E、心血虚

9、三部脉分候脏腑，左寸候的是(E)

- A、肾
- B、肺
- C、脾
- D、肝
- E、心

腰肾酸软，滑精早泄，多见于(D)

- A、肾阳虚证
- B、肾阴虚证
- C、肾精不足证
- D、肾气不固证
- E、肾不纳气证

11. 缓则治其本治则适用(D)

- A、腹水鼓胀
- B、肠热便秘
- C、虚人感冒
- D、肺癆咳嗽
- E、湿热泄泻

12. 属于反治的是(C)

- A、热者寒之
- B、寒者热之
- C、塞因塞用
- D、虚则补之

E、实则泻之

13、头痛经久不愈，痛处固定属于(D)

- A、风寒头痛
- B、风热头痛
- C、风湿头痛
- D、瘀血头痛
- E、肝阳头痛

14、肺阴虚选用方药(E)

- A、左归丸加减
- B、右归丸加减
- C、七福饮加减
- D、补肺汤加减
- E、沙参麦冬汤加减

15. 根据藏药八性理论，治隆病采用的药物性能是(E)

- A、热锐
- B、凉钝
- C、轻糙
- D、柔软
- E、重腻

16 三酰甘油高于正常值，其临床意义是(E)

- A、肝功能严重障碍
- B、甲状腺功能亢进
- C、肾上腺皮质功能减退
- D、甲状旁腺功能亢进
- E、动脉粥样硬化

17 、执业药师需要特别提醒的特殊情况是(C)

- A、患者购买贵重药品
- B、患者购买非处方药
- C、患者购买的药品近期发现有严重不良反应
- D、患者购买长期维持治疗的药品
- E、患者购买按疗程治疗的药品

18、处方写锦纹应付(D)

- A、槟榔
- B、南沙参
- C、大黄
- D、杜仲
- E、肉苁蓉

19 处方写延胡索应付(D)

- A、酒炒品
- B、清炒品
- C、麸炒品
- D、醋炙品
- E、盐炙品

20 服用藿香正气丸的药引是(B)

- A、黄酒
- B、姜汤
- C、米汤
- D、盐水
- E、清茶

21、功效不同，不可同放于一个斗中的是(D)

- A、板蓝根和大青叶
- B、当归和川芎
- C、篇蓄和瞿麦
- D、当归和独活
- E、牡丹皮和赤芍

22 容易泛油的是(B)

- A、苦参
- B、当归
- C、厚朴
- D、板蓝根
- E、何首乌

23 饮片的含水量是(D)

- A、5-10%
- B、5-13%
- C、7-10%
- D、7-13%
- E、10-13%

24、服用感冒药期间不宜用的是(A)

- A、左归丸
- B、越鞠丸
- C、二陈丸
- D、正天丸
- E、都梁丸

25. 木香顺气丸既能健脾和胃，又能(C)

- A、宽中除满
- B、理气消胀
- C、行气化湿
- D、疏肝理气
- E、疏肝消滞

26. 地榆槐角丸既能疏风润燥，又能(E)

- A、凉血息风
- B、凉血祛湿
- C、凉血活血
- D、凉血消溃
- E、凉血泻热

27. 更年宁片既能滋阴清热，又能(C)

- A、补气养血
- B、养血调经
- C、除烦安神
- D、活血止痛
- E、养心安神

28. 明目蒺藜丸既能明目退翳，又能(E)

- A、解郁清热
- B、清热养血
- C、清热解毒
- D、散风止血
- E、清热散风

29. 仙灵骨葆胶囊既能滋补肝肾，又能(A)

- A、活血通络
- B、祛风通络
- C、蠲痹通络
- D、舒筋通络
- E、除湿通络

30. 既温补肾阳，益肾壮督，又搜风剔筋的中成药是(E)

- A、独活寄生丸
- B、追风透骨片
- C、舒筋活血丸
- D、养血荣筋丸
- E、益肾蠲痹丸

31. 应慎用龙牡壮骨颗粒的是(B)

- A、小儿脾虚证
- B、小儿实热证

- C、小儿体弱多汗
- D、小儿夜惊不宁
- E、小儿食欲不振

32. 复方当归四物汤与妇科千金片同用后，能提高的是(E)

- A、止痉效果
- B、止痛效果
- C、止血效果
- D、止泻效果
- E、止带效果

33. 中西药联用能减少西药用量和副作用的药组是(A)

- A、桂枝汤与皮质激素类
- B、复方川贝精片和降压药
- C、防风通圣丸与解热镇痛药
- D、大黄清胃丸与喹诺酮类
- E、五味子糖浆与磺胺类

34. 中西药联用会降低疗效的药组(A)

- A、参茸片和格列本脲
- B、灵芝片与苯巴比妥
- C、四逆汤与地高辛
- D、小青龙合剂与氨茶碱
- E、丹参注射液与多巴胺

35. 含咖啡因的中成药(C)

- A、金羚感冒片
- B、桑菊感冒片
- C、感冒灵胶囊
- D、荆防颗粒
- E、玉屏风颗粒

36. 肝功能不全者应慎用的中药(E)

- A、枸杞子
- B、菟丝子
- C、决明子
- D、五味子
- E、川楝子

37. 过量服用会发生血尿的中药(B)

- A、麻黄
- B、肉桂
- C、黄芪
- D、石斛

E、人参

38. 金匱肾气丸所含的有毒中药(A)

- A、附子
- B、蟾酥
- C、雄黄
- D、朱砂
- E、黄药子

39. 中国古代收方最多的方书是(A)

- A、《普济方》
- B、《千金要方》
- C、《千金翼方》
- D、《和剂局方》
- E、《太平圣惠方》

40. 特别适于小儿的针具(D)

- A、毫针
- B、芒针
- C、三棱针
- D、皮肤针
- E、皮内针

二、配伍选择题（共 80 题，每题 0.5 分，题目分为若干组，每组题目对应同一组各选项，备选可重复选用，也可不选用，每题只有 1 个最佳答案）

【41~42】

- A、肝
- B、心
- C、脾
- D、肺
- E、肾

41. 能调通水道的是(D)

42. 能运化水液的是(C)

【43~46】

- 43. 血液在脉内循行是依赖气的(A)
- 44. 维持人体恒定体温是依赖气的(B)
- 45. 护卫肌表是依赖气的(C)
- 46. 防止血液溢出脉外(D)

【47~48】

- A 气海
- B 血海
- C 阳脉之海

- D 阴脉之海
- E 十二筋脉之海
- 47. 督脉为(C)
- 48. 任脉为(D)

【49-51】

- A 痛疼剧烈
- B 肌肤不仁
- C 周身困重
- D 迫血妄行
- E 病位游移
- 49. 风邪的致病特点是(E)
- 50. 寒邪的致病特点是(A)
- 51. 火邪的致病特点是(D)

【52-54】

- A 血虚
- B 血热
- C 血瘀
- D 血寒
- E 出血
- 52. 血液不足，称为(A)
- 53. 血行不畅，称为(C)
- 54. 血溢脉外，称为(E)

【55-56】

- A 胀痛
- B 重通
- C 刺痛
- D 隐痛
- E 掣痛
- 55. 气滞多见(A)
- 56. 淤血多见(C)

【57-58】

- A 食欲减退
- B 消谷善饥
- C 恶闻食臭
- D 饥不欲食
- E 嗜食异物
- 57. 伤食多见(C)
- 58. 脾胃虚弱多见(A)

【59-62】

- A 心悸气短，体倦乏力
- B 心悸胸闷，形寒肢冷
- C 心悸心烦，唇舌色淡
- D 心悸心烦，潮热盗汗
- E 心悸胸闷，心前区刺痛

59. 心气虚证常见(A)

60. 心血虚证常见(C)

61. 心阴虚证常见(D)

62. 心阳虚证常见(B)

【63-65】

A 风寒闭肺喘证

B 痰热郁肺喘证

C 肾虚作喘喘证

D 肺脾两虚喘证

E 肺肾阴虚喘证

63. 桑白皮汤适用于(B)

64. 麻黄汤适用于(A)

65. 金匱肾气丸适用于(C)

【66-68】

A 肺气虚

B 心气虚

C 脾气虚

D 肾气虚

E 肺阴虚

66. 咳嗽无力，短气自汗，多见于(A)

67. 倦怠乏力，大便溏薄，多见于(C)

68. 神疲乏力，腰膝酸软，多见于(D)

【69-70】

A 淫羊藿

B 天冬

C 华山参

D 滑石

E 商陆

69. 孕妇禁用的中药是(E)

70. 孕妇慎用的中药是(C)

【71-74】

A、开窍药

B、苦寒药

C、熄风药

D、涩肠药

E、淡渗利湿药

- 71、脱证神昏者，忌用 (A)
72、脾虚便溏者，忌用 (B)
73、阴虚津亏者，忌用 (E)
74、湿热泻痢者，忌用 (D)

【75-76】

- A、逍遥丸
B、五子衍宗丸
C、桂枝茯苓丸
D、六味地黄丸
E、骨刺宁胶囊
75、孕妇禁用的中成药是 (E)
76、孕妇慎用的中成药是 (C)

【77-80】

- A、生磁石
B、降香
C、雷丸
D、葶苈子
E、羚羊角
77、宜先煎的饮片是 (A)
78、宜后下的饮片是 (B)
79、宜包煎的饮片是 (D)
80、宜另煎的饮片是 (E)

【81-82】

- A、大蒜
B、冰片
C、黑豆
D、花椒
E、萆澄茄
81、宜于蛤蚧对抗贮存的是 (D)
82、宜于土鳖虫对抗贮存的是 (A)

【83-84】

- A、天冬
B、黄柏
C、香薷
D、栀子
E、党参
83、易失去气味的饮片是 (C)
84、易失生虫的饮片是 (E)

【85-88】

- A、疏风解表
 - B、解表清热
 - C、宣肺止咳
 - D、益气解表
 - E、解肌清热
- 85、银翘解毒丸既能清热解毒，又能（A）
- 86、感冒清热颗粒疏风解表，又能（B）
- 87、葛根黄连丸既能止泻止痢，又能（E）
- 88、参苏丸既能疏风散寒、祛痰止咳，又能（D）

【89-91】

- A、散寒止痛
 - B、泻火止痛
 - C、活血止痛
 - D、行气止痛
 - E、缓急止痛
- 89、天麻头痛片既能养血祛风，又能（A）
- 90、小建中颗粒既能温中补虚，又能（E）
- 91、复方黄连素片既能清热燥湿，止痢止泻，又能（D）

【92-95】

- A、二陈丸
 - B、急支糖浆
 - C、镇咳宁糖浆
 - D、清肺抑火丸
 - E、炼蜜川贝枇杷膏
- 92、治风热咳嗽宜用的是（B）
- 93、治风寒咳嗽宜用的是（C）
- 94、治痰热咳嗽宜用的是（D）
- 95、治肺燥咳嗽宜用的是（E）

【96-98】

- A、健脾养心
 - B、升阳举陷
 - C、疏肝和胃
 - D、益气健脾
 - E、温补气血
- 96、补中益气丸既能补中益气，又能（B）
- 97、香砂六君丸既能和胃，又能（D）
- 98、人参健脾丸既能益气补血，又能（A）

【99-101】

- A、健脾消食
- B、解表散热

- C、疏肝解郁
- D、疏肝清热
- E、消胀止痛

- 99、柴胡舒肝丸既能疏肝理气，又能（E）
100、护肝片既能疏肝理气，又能（A）
101、小柴胡颗粒既能疏肝和胃，又能（B）

【102-104】

- A、健脾消食
- B、行气消痞
- C、行气利水
- D、理湿和中
- E、通络止痛

- 102、香砂枳术丸既能健脾开胃，又能（B）
103、槟榔四消丸既能消食导滞，又能（C）
104、加味保和丸既能健胃理气，又能（D）

【105-106】

- A、益气养血
- B、理气活血
- C、理气养血
- D、理气止痛
- E、理气疏肝

- 105、艾附暖宫丸既能暖宫调经，又能（C）
106、八珍益母丸既能活血调经，又能（A）

【107-108】

- A、清热解毒消肿止痛
- B、清音利咽消肿止痛
- C、润肺利咽生津止渴
- D、疏风清热消肿止痛清利咽喉
- E、疏风清热化痰散结利咽开音

- 107、铁笛丸的功能是（C）
108、黄氏响声丸的功能是（E）

【109-110】

- A、六应丸与紫雪散
- B、胆宁片与妙济丸
- C、天麻丸与苏合香丸
- D、牛黄解毒片与金匱肾气丸
- E、附子理中丸与参茸卫生丸

- 109、因配伍禁忌不宜合用的药组是（B）
110、因证候禁忌不宜合用的药组是（D）

【111-114】

- A、缩短疗程
 - B、降低毒性
 - C、减少用量
 - D、协同增效
 - E、改善体质
- 111、真武汤与氢氯噻嗪合用，能（D）
- 112、香连化滞丸与呋喃唑酮合用，能（D）
- 113、贞芪扶正胶囊与环磷酰胺合用，能（B）
- 114、苓桂术甘汤与地西洋合用，能（C）

【115-116】

- A、影响药物吸收
 - B、影响药物分布
 - C、影响药物代谢
 - D、增加药物排泄
 - E、减少药物排泄
- 115、麻仁丸与红霉素联用，能（A）
- 116、冰硼散与磺胺类药物联用，能（D）

【117-120】

- A、木瓜丸
 - B、舒筋丸
 - C、醒消丸
 - D、苏合香丸
 - E、独活寄生丸
- 117、内含雄黄的中成药是（C）
- 118、内含乌头的中成药是（A）
- 119、内含朱砂的中成药是（D）
- 120、内含马钱子的中成药是（B）

多选题

- 121、对脾的“志液体华窍”描述正确的是（CD）
- A、在志为悲
 - B、在液为唾
 - C、在体为肉
 - D、在华为唇
 - E、在窍为舌
- 122、疫疠之气发生与流行的相关因素有（ABD）
- A、气候反常
 - B、水源污染
 - C、六淫外感
 - D、隔离不当

E、饮食不节

123、形成血瘀的常见原因有(ABCE)

- A、气滞
- B、气虚
- C、外伤
- D、寒邪
- E、热邪

124、既病防变的基本原则有(BD)

- A、人工免疫
- B、早期诊治
- C、讲究卫生
- D、控制传变
- E、防止复发

125、弦脉所主的病证主要有(ACE)

- A、肝胆病
- B、实热
- C、痰饮
- D、瘀血
- E、痛症

126、与因人制宜治则相关的有(ABCE)

- A、年龄
- B、性别
- C、体质
- D、地域
- E、职业

127、肾阴虚的症状是(ABCD)

- A、腰膝酸软
- B、眩晕耳鸣
- C、两足痿弱
- D、烦热盗汗
- E、脉象沉迟

128、乳癖，证属冲任失调的临床表现(ACE)

- A、乳房胀痛
- B、大便溏泻
- C、月经紊乱
- D、心烦易怒
- E、胸闷胁胀

129、蒙医认为，用药期间必忌的饮食主要有(ABCD)

- A、浓茶
- B、山羊肉
- C、猪肉
- D、荞麦
- E、小麦

130、尿中白细胞增多常见于(ABCE)

- A、泌尿系统感染
- B、慢性肾盂肾炎
- C、前列腺炎
- D、挤压综合征
- E、膀胱炎

131、执业药师承接患者咨询的内容主要有(ABCDE)

- A、用药方法
- B、用药剂量
- C、药品不良反应
- D、药品相互作用
- E、汤剂煎煮方法

132、医师处方在书写药名时，对药品产地提出要求的药名有(ACD)

- A、怀山药
- B、陈香橼
- C、田三七
- D、杭白芍
- E、绵茵陈

133、炮制后多入丸散用的毒性中药(ACD)

- A、斑蝥
- B、天仙子
- C、生马钱子
- D、生甘遂
- E、生川乌

134、贮存中易发生酸败的剂型(BCE)

- A、蜜丸
- B、合剂
- C、酒剂
- D、水丸
- E、糖浆剂

135、使用非处方药注意事项(ABCE)

- A、查看外包装，不能有破损
- B、详细阅读说明书
- C、严格按药品说明书用药
- D、保存发票便于退换
- E、妥善保管药品

136、冠心苏合丸使用注意事项有(ACE)

- A、孕妇禁用
- B、阴虚火旺者禁用
- C、胃溃疡患者禁用
- D、出血性疾病慎用
- E、过敏性体质慎用

137、合理用药的基本原则包括(ABDE)

- A、安全
- B、有效
- C、迅速
- D、简便
- E、经济

138、老年人长期泡服胖大海导致的不良反应有(ABCE)

- A、清瘦
- B、饮食减少
- C、大便溏泻
- D、尿赤涩痛
- E、脘腹痞闷

139、《中华人民共和国药典》(2010年版)一部收载有(ABCDE)

- A、药材
- B、饮片
- C、提取物
- D、单味制剂
- E、成方制剂

140、对人体具有潜在危险，必须对其安全性和有效性严格控制的医疗器械有(CE)

- A、助听器
- B、光学内窥镜
- C、体外震波碎石机
- D、医用脱脂纱布
- E、一次性使用无菌注射器